




Éric Jarasse
Eygurande
(Haute-Corrèze, Limousin)
1 UTH/ 43 Ha

Bovins Laitiers

→ La démarche

« Mon objectif c'est d'avoir de l'herbe en quantité et en qualité du 20 Mars jusqu'à la Toussaint »

Éric mise tout sur le pâturage pour être le plus économe et autonome possible. Ce qui compte pour lui c'est la qualité du lait, la marge sur la production et non la quantité. En 1993, il reprend l'exploitation familiale de veaux de lait avec 43 hectares de SAU. (12 en location). La spécialisation des systèmes d'exploitation le pousse à réorienter la production veaux de lait de la ferme vers une production laitière. Il débute avec 93 000 litres de quota laitier. En 1998, il bénéficie d'une augmentation du quota à 120 000l. Son troupeau est, à ce jour, constitué de 26 mères qui ont une production de 5 000 litres/an/UGB .

En 2005, il rentre dans l'ADAPA (Association Pour le Développement d'une Agriculture Plus Autonome). Cette adhésion le conforte dans sa vision de l'agriculture et l'aide à optimiser ses pratiques.

→ Le système

Le pâturage tournant et l'autonomie décisionnelle

En mars il commence son « tour de nettoyage ». Début Avril les 12 Ha de parcelles d'enrubannage sont nettoyés. Les vaches s'attaquent ensuite aux 5.5 ha de surface de base où 30 ares/VL/jour sont disponibles. Vers le 15 Avril elles vont sur les 18 ha de foin jusqu'aux premiers jours de Mai. C'est seulement le 5-6 Mai qu'elles retournent sur la surface de base jusqu'au 15 Juin (1 are par bête en pleine pousse de l'herbe) et elles continuent sur cette surface jusqu'à la repousse des foins.

Dans les faits il faut réajuster chaque année en fonction de la météo : « Ça fait 12 ans maintenant que je fais ça : je commence à avoir le coup d'œil »

Intrants

Céréales

Pulpes de betteraves


Efficacité économique

(EBE/Produit) : 47

Quantité de concentré 542 kg/VL/an

Charges opérationnelles 16926 Euros /an

Frais vétérinaire : 53 Euros/an /UGB



Vente

Quota: 113 000 L en
laiterie (UHT)

Quelques veaux de lait

Bâtiments

Étable et grange
traditionnelle

Les zones humides

« Au début mes zones humides, je leur prêtais moins d'attention. Je ne comptais pas dessus pour le lait. Et puis j'ai mis le système en place et on voit que ça les dynamise. C'est même plus souple car il y a beaucoup plus de plantes, de variétés. Une prairie de ray gras ou dactyle, il faut être sûr de pouvoir faire le tour au bon stade sinon il faut faucher. La prairie humide, il y a toujours du bien appétant dedans et il n'y a pas de tonnes à eau à amener »

« En 2011, j'ai eu des pesées sur les génisses qui étaient restées 7 mois de l'année sur zones humides : les croissances sont aussi bonnes qu'en prairies temporaires »

Le parasitisme

« La rotation casse le cycle des parasites et il y a des plantes dans les zones humides qui les aident à se déparasiter. (Lotier des marais..)

Pour quelques bêtes seulement, ça peut être plus difficile les deux premières années. Elles peuvent perdre un peu de poids mais elles se rattrapent en été et en automne. C'est la diversité de la flore leur font reprendre le dessus. »

Mixité du troupeau et rusticité réfléchi et choisi

Éric travaille sa rusticité à deux niveaux :

- la sélection génétique et le croisement des races,
- la capacité d'ingestion et les qualités herbagères du troupeau.

Les Prim'Holstein, race très adaptable, lui permet d'assurer un volume de production. Les Abondances amènent une rusticité par la limitation des frais vétérinaires, une longévité importante et une qualité de lait qui compense largement les 1000 litres de lait en moins par an. Elles assurent une lactation longue et sans problème même sans concentré.

Un regard différent sur les zones humides

« Quand c'est la nuit, elles savent ; elles mangent jusqu'à la nuit noire. Je pense que quand il fait bien chaud la journée, il y a une fraîcheur dans ces milieux qui les rendent plus appétant. Elles mangent de bon cœur »



Réalisé par

FRCIVAM en Limousin

Cézarín

19460 Naves

limousin@civam.org

Avec la participation de:



Et avec le soutien financier de:

